Critères d'exclusion d'un enfant d'un milieu de garde ou d'un milieu scolaire

L'enfant fait-il de la **fièvre*** le matin à la maison ? — **Oui**

Non

L'enfant développe-t-il de la **fièvre*** à l'école ?
OU
L'enfant de moins de 3 mois développe-t-il de la **fièvre*** en milieu de garde ?
OU
Si l'enfant de 3 mois et plus développe de la **fièvre*** en milieu de garde, lui donner, si indiqué, de l'acétaminophène selon le protocole.
Est-ce que la fièvre* est toujours présente 1 heure après ? — **Oui**

Non

L'enfant a-t-il un **état de santé** qui l'empêche de suivre les activités du groupe ? Son état de santé empêche-t-il la personne responsable de s'occuper adéquatement des autres enfants ? — **Oui**

Non

L'enfant a-t-il eu **2 vomissements** ou plus dans les dernières 24 heures ? — **Oui**

Non

L'enfant a-t-il eu des épisodes de **diarrhée** trop abondante pour être contenue dans la couche OU contenant du sang ou du mucus OU l'enfant est-il incontinent (incapable de se rendre à la salle de bain) ? — **Oui**

Non

L'enfant a-t-il des **lésions cutanées avec écoulement purulent (pus)** qui ne peuvent pas être couvertes par un pansement imperméable ? — **Oui**

Non

L'enfant a-t-il reçu une consigne d'un professionnel de la santé d'être exclu temporairement du milieu ? — **Oui**

Non

Il n'est pas nécessaire d'exclure l'enfant.
Surveillez son état de santé et rehaussez les pratiques de base telles que l'hygiène des mains, l'hygiène et l'étiquette respiratoires ainsi que le nettoyage et la désinfection des objets, des surfaces et des locaux.

En aucun temps, cet outil ne doit remplacer une consultation avec un professionnel de la santé et les consignes associées au diagnostic posé.

Exclure l'enfant du milieu.
Il doit rester à la maison.

Le retour sera permis lorsque toutes les conditions suivantes s'appliqueront :

- **Absence de fièvre*.**
- **L'état général de l'enfant** lui permet de participer aux activités du groupe et ne nécessite pas ou très peu de soins supplémentaires.
- **Aucun vomissement** depuis 24 heures.
- **Si épisode de diarrhée :** Les selles sont retenues dans la couche ou l'enfant est continent. Absence de sang et de mucus dans les selles diarrhéiques.
- **Si présence de lésions cutanées purulentes :** Absence d'écoulement ou possibilité de couvrir les lésions avec un pansement imperméable.
- **Si exclu en raison d'une consigne d'un professionnel de la santé :** Retour dans le milieu selon la consigne.

*** Définition de la fièvre :**

Enfant de moins de 3 mois :
- 38,0 °C et plus (rectum)

Enfant de 3 mois et plus :
- 38,5 °C et plus (rectum)
- 38,0 °C et plus (bouche, mais s'applique seulement pour les 5 ans et plus)
- 37,5 °C et plus (aisselle)

La température par le rectum est plus fiable.

Adapté d'une production de la Direction régionale de santé publique de Montréal

25-207-01WFA

Votre gouvernement

Québec